

كوفيد-19 موجز الإرشادات رقم 2

إجراءات صيدليات المجتمع واستشارات المرضى

1. في العديد من الدول، أصبحت العدوى القائمة على المجتمع المحلي الشكل الرئيسي لانتقال المرض. إن السفر من المناطق الموبوءة لا يزال معياراً تقييمياً مهماً في البلدان التي سُجلت فيها حالات قليلة أو التي لا زالت في المرحلة الأولية من تفشي المرض، لكنه قد لا يكون معياراً مناسباً في البلدان التي تنتقل فيها العدوى المجتمعية.

2. بما أن العدوى يمكن أن تنتقل من المرضى الذين لم تظهر عليهم أي أعراض أو قبل ظهور الأعراض، فمن المستحسن توخي الحذر مع جميع العملاء والمرضى الذين يدخلون الصيدلية.

المعايير	الإجراءات
ما من أعراض (سعال، حمى أو ضيق في التنفس) و ما من احتكاك مؤخراً مع حالات مؤكدة أو مشبوهة بكوفيد-19 وما من سجل سفر قريب المدى إلى الأماكن الموبوءة	• طمأنة الشخص • التشديد على الإجراءات الوقائية • التوصية بالتباعد الاجتماعي والحجز المنزلي وتجنب السفر غير الضروري (داخلياً وخارجياً) بقدر الإمكان • تقديم معلومات ونصائح مبنية على أدلة (شفهية و/أو مكتوبة)
وجود أعراض (سعال، حمى أو ضيق في التنفس) و ما من احتكاك مؤخراً مع حالات مؤكدة أو مشبوهة بكوفيد-19 وما من سجل سفر قريب المدى إلى الأماكن الموبوءة	• طمأنة الشخص • إبلاغه بأن خطر الإصابة بكوفيد-19 قد يكون موجوداً • إذا أمكن، عزل المريض في غرفة منفصلة • الامتناع عن فحص المريض جسدياً • تعزيز إجراءات الحماية الذاتية بما في ذلك استخدام قناع تنفسي مناسب مع ارتداء القفازات والنظارات الوقائية • التركيز على التدابير الوقائية للحد من أي تناقل إضافي بما في ذلك استخدام المريض لقناع الوجه • التوصية بالتباعد الاجتماعي الصارم (بما في ذلك العائلة والمقربون)، والحجز المنزلي وتجنب كل أنواع السفر (الداخلي والخارجي) لمدة 14 يوماً على الأقل • بالنسبة إلى الأفراد من الفئات الأكثر عرضة للخطر، النصح بالاتصال على رقم طوارئ أو رقم ساخن أو الاتصال بمرفق صحي للاختبار والرعاية والعلاج والمتابعة • تقديم معلومات ونصائح مبنية على أدلة (شفهية و/أو مكتوبة) • تطهير أي مناطق وأسطح يحتمل أن تكون موبوءة

• طمأننة الشخص • إبلاغه بأن خطر الإصابة بكوفيد-19 قد يكون موجوداً • التوصية بالتباعد الاجتماعي، والحجر المنزلي وتجنب كل أنواع السفر (الداخلي والخارجي) لمدة 14 يوماً على الأقل • التوصية بتعقب تاريخ اتصالات الشخص	• ما من أعراض (سعال، حمى أو ضيق في التنفس) • و • حصول احتكاك مؤخراً مع حالات مؤكدة أو مشبوهة بكوفيد-19 و/أو سفر قريب المدى إلى الأماكن الموبوءة
• التوصية بالتباعد الاجتماعي الصارم (بما في ذلك العائلة والمقربون)، والحجر المنزلي وتجنب كل أنواع السفر (الداخلي والخارجي) لمدة 14 يوماً على الأقل • بالنسبة إلى الأفراد من الفئات الأكثر عرضة للخطر، النصح بالاتصال على رقم طوارئ أو رقم ساخن أو الاتصال بمرفق صحي للاختبار والرعاية والعلاج والمتابعة • تقديم معلومات ونصائح مبنية على أدلة (شفهية و/أو مكتوبة) • تطهير أي مناطق وأسطح يحتمل أن تكون موبوءة	• طمأننة الشخص • إبلاغه بأن خطر الإصابة بكوفيد-19 قد يكون موجوداً • إذا أمكن، عزل المريض في غرفة منفصلة • الامتناع عن فحص المريض جسدياً • تعزيز إجراءات الحماية الذاتية بما في ذلك استخدام قناع تنفسي مناسب مع ارتداء القفازات والنظارات الوقائية • التركيز على التدابير الوقائية للحد من أي تناقل إضافي بما في ذلك استخدام المريض لقناع الوجه

للحصول على التفاصيل والمراجع الداعمة، راجع وثيقة التوجيه الكاملة على www.fip.org/coronavirus

تستند هذه الوثيقة إلى الأدلة والتوصيات المتاحة لمنظمات حسنة السمعة في وقت النشر. سيتم تحديثها عندما تصبح المعلومات الجديدة متوفرة. 26 آذار 2020.

ترجمة:

