COVID-19 指南摘要单页 #2

社区药房干预和患者咨询

1. 在许多国家，以社区为基础的传染已成为疾病传播的主要形式。 虽然在仅有少数病例或疫情爆发初期，疫区的旅行史仍然是重要的评估标准，但在已有社区传播的国家中，这可能将不再是相关标准。

2. 由于感染可能来自无症状或有症状的个体，因此建议对所有进入药房的顾客和患者均要采取预防措施。

患者分级	干预措施	
• 无临床症状（咳嗽、发热或呼吸困难）**且** • 近期未接触COVID-19确诊或疑似病例**和**近期无疫区旅行史	• 给予关切 • 强化预防措施 • 建议尽可能保持社交距离，居家，避免不必要的（国内和国际）旅行	• 提供有证据支持的信息和建议（口头和/或书面）
• 有临床症状（咳嗽、发烧或呼吸困难）**且** • 近期未接触 COVID-19 确诊或疑似病例**和**近期无疫区旅行史	• 给予关切 • 告知可能存在COVID-19风险 • 尽可能对患者进行单独隔离 • 不要对患者进行查体 • 采取自我防护措施，包括使用合适的呼吸器、手套以及护目镜 • 强调可能导致病毒传播的预防措施，包括让患者使用口罩	• 建议其至少在14天内实施严格的社交隔离（含家人和关系密切者）、居家隔离，以及避免所有（国内和国际）旅行 • 对于高危人群，建议其拨打应急电话/热线或联系合适的医疗机构进行检测和后续诊疗 • 提供有证据支持的信息和建议（口头和/或书面） • 对任何可能被污染的区域和表面进行消毒
• 无临床症状（咳嗽、发烧或呼吸困难）**且** • 近期接触过 COVID-19 确诊或疑似病例**和/或**近期有疫区旅行史	• 给予关切 • 告知可能存在COVID-19风险 • 建议其至少在14天内实施严格的社交隔离（含家人和关系密切者）、居家隔离，以及避免所有（国内和国际）旅行 • 建议追踪接触史	• 如果在与确诊或疑似病例接触后的14天内出现症状，请联系应急电话/热线，并遵循相关指示 • 提供有证据支持的信息和建议（口头和/或书面）
• 有临床症状（咳嗽、发烧或呼吸困难）**且** • 近期接触过 COVID-19 确诊或疑似病例**和/或**近期有疫区旅行史	• 给予关切 • 告知可能存在COVID-19感染风险 • 尽可能对患者进行单独隔离 • 不要对患者进行查体 • 采取自我防护措施，包括使用合适的呼吸器、手套以及护目镜 • 强调可能导致病毒传播的预防措施，包括让患者使用口罩	• 建议其至少在14天内实施严格的社交隔离（含家人和关系密切者）、居家隔离，以及避免所有（国内和国际）旅行 • 对于高危人群，建议其拨打应急电话/热线或联系合适的医疗机构进行检测和后续诊疗。 • 提供有证据支持的信息和建议（口头和/或书面） • 对任何可能被污染的区域和表面进行消毒

详细信息及支持性参考文献，请见完整指南：www.fip.org/coronavirus

本指南基于现有证据及出版时信誉良好的组织提供的建议，并将依据新知识的出现而更新。

2020.3.26

fip ADVANCING PHARMACY WORLDWIDE

中国药学会 CHINESE PHARMACEUTICAL ASSOCIATION 1907