

COVID-19 SAŽETAK SMERNICA #2

Intervencije farmaceuta u apoteci otvorenog tipa i savetovanje pacijenata

1. U mnogim zemljama, prenošenje infekcije u društvenoj zajednici postalo je glavni način prenošenja infekcije. Dok je istorija putovanja u žarišnim područjima i dalje važan kriterijum za procenu u zemljama sa nekoliko identifikovanih slučajeva ili u početnoj fazi izbijanja infekcije, on možda više neće biti relevantan kriterijum u zemljama gde se infekcija prenosi unutar zajednice.

2. Obzirom da infekcija može da se prenese sa osoba koje su asimptomatske ili presimptomatske, preporučuje se oprez sa SVIM pacijentima i kupcima koji dolaze u apoteku.

KRITERIJUMI	INTERVENCIJE
<ul style="list-style-type: none">• Bez prisutnih simptoma (kašalj, temperatura ili poteškoće sa disanjem) + • Bez skorašnjeg kontakta sa osobom za koju se sumnja ili je potvrđeno da je zaražena virusom COVID – 19 i bez skorašnje istorije putovanja u područja koja su žarište zaraze	<ul style="list-style-type: none">• Umanjiti/otkloniti strah i paniku kod pacijenta• Istači značaj preventivnih mera• Preporučiti izbegavanje okupljanja (socijalno distanciranje), samoizolaciju i izbegavanje putovanja koja nisu neophodna (u zemlji i inostranstvu) kada god je to moguće.
<ul style="list-style-type: none">• Prisutni simptomi (kašalj, temperatura ili poteškoće sa disanjem) + • Bez skorašnjeg kontakta sa osobom za koju se sumnja ili je potvrđeno da je zaražena virusom COVID – 19 i bez istorije putovanja u područja koja su žarište zaraze	<ul style="list-style-type: none">• Umanjiti/otkloniti strah i paniku kod pacijenta• Ukažati da postoji rizik da je pacijent zaražen COVID – 19 virusom• Kada god je to moguće, izolovati pacijenta u zasebnu sobu• Ne pregledati pacijenta• Pojačati mere sopstvene zaštite nošenjem maske/respiratora¹, zaštitnih naočara i rukavica• Posebno istaći pacijentu neophodnost preduzimanja mera, poput nošenja zaštitne maske, u cilju sprečavanja daljeg širenja zaraze.
<ul style="list-style-type: none">• Bez prisutnih simptoma (kašalj, temperatura ili poteškoće sa disanjem) + • Skorašnji kontakt sa osobom za koju se sumnja ili je potvrđeno da je zaražena virusom COVID – 19 i/ili skorašnje putovanje u područja koja su žarište zaraze	<ul style="list-style-type: none">• Umanjiti/otkloniti strah i paniku kod pacijenta• Ukažati da postoji rizik da je pacijent zaražen COVID – 19 virusom• Preporučiti socijalno distanciranje, kućni karantin i izbegavanje bilo kakvih putovanja najmanje u narednih 14 dana• Preporučiti da se isprate sve osobe sa kojima je osoba ranije bila u kontaktu

¹ termin „respirator“ u daljem tekstu odnosi se na određeni tip maske za lice

Za detaljnije informacije i reference, pogledajte smernice u celini na www.fip.org/coronavirus

Ovaj dokument je pripremljen na osnovu dostupnih dokaza i preporuka vodećih organizacija u trenutku objavljivanja. Dokument će biti ažuriran po dobijanju novih saznanja. 26. mart 2020. godine

Preveli:

Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet i Farmaceutska komora Srbije



- Prisutni simptomi (kašalj, temperatura ili poteškoće sa disanjem)
 - +
 - Skorašnji kontakt sa osobom za koju se sumnja ili je potvrđeno da je zaražena virusom COVID – 19 i/ili skorašnje putovanje u područja koja su žarište zaraze
- Umanjiti/otkloniti strah i paniku kod pacijenta
- Ukazati da postoji rizik da je pacijent zaražen COVID – 19 virusom
- Kada god je to moguće, izolovati pacijenta u zasebnu sobu
- Ne pregledati pacijenta
- Pojačati mere sopstvene zaštite nošenjem maske/respiratora¹, zaštitnih naočara i rukavica
- Posebno istaći pacijentu neophodnost preduzimanja mera, poput nošenja zaštitne maske, u cilju sprečavanja daljeg širenja zaraze.
- Preporučiti obavezno distanciranje pacijenta (čak i od članova porodice i bliskih osoba), kućni karantin i izbegavanje bilo kakvih putovanja najmanje u narednih 14 dana
- Pacijentima koji pripadaju visokorizičnim grupama, savetovati da se javi na dežurne brojeve telefona kako bi se obavilo testiranje i pružio odgovarajući tretman.
- Pružiti informacije zasnovane na dokazima i odgovarajući savet (usmeno i/ili pisano)
- Dezinfikujte sva potencijalno kontaminirana područja i površine

Za detaljnije informacije i reference, pogledajte smernice u celini na
www.fip.org/coronavirus

Ovaj dokument je pripremljen na osnovu dostupnih dokaza i preporuka vodećih organizacija u trenutku objavljanja. Dokument će biti ažuriran po dobijanju novih saznanja. 26. mart 2020. godine

Preveli:
Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet i
Farmaceutska komora Srbije

