

COVID-19 SAŽETAK SMERNICA #4

Procedure u apotekama

Izložbeni prostor u oficini

1. Pristup proizvodima koje pacijenti/kupci mogu sami da izaberu treba biti ograničen na taj način da se izbegne da više ljudi dodiruje ove proizvode. Pristup ovim proizvodima treba da ima samo osoblje apoteke.

Za recepturom

1. Kad god je to moguće, za jednim recepturnim mestom/na jednom mestu u apoteci bi trebalo da bude jedan zaposleni i treba izbegavati zamene mesta.
2. Na recepturnom mestu bi trebalo da se drže samo najneophodniji predmeti.
3. Obrišite i dezinfikujte recepturno mesto nakon svakog pacijenta/kupca
4. Imajte pri ruci sredstvo za dezinfekciju ruku na bazi alkohola kako bi dezinfikovali ruke nakon pristupanja svakom pacijentu/kupcu.
5. Ukoliko je moguće, podstičite pacijente da poruče lekove (u zemljama gde je to dozvoljeno prema zakonskim aktima) preko internet stranice apoteke koji bi bili isporučeni do njihove kuće ili radnog mesta.

Socijalno distanciranje

1. Ograničite broj pacijenata/kupaca koji ulaze u apoteku u svakom trenutku.
2. Održavajte razmak od minimum 1 metra (poželjno i više) kada pristupate pacijentu.
3. Ukoliko je neophodno, možete koristiti posudu da bi primili recept, isporučili lekove i realizovali naplatu u cilju održavanje distance.
4. Savetujte pacijente da međusobno održavaju razmak od minimum 1 metra dok čekaju, i trakom označite mesta na podu gde treba da stoje.

Poseta apoteci

1. Savetujte pacijente/kupce da izbegavaju duža zadržavanja u apoteci.
 2. Savetujte pacijente/kupce da izbegavaju posete apoteci ukoliko su stariji ili imaju komorbiditete.
- Kad god je moguće, ovi pacijenti bi trebalo da zamole člana porodice, prijatelja ili komšiju da umesto njih ode do apoteke.

Preporuke za usluge i aktivnosti farmaceuta u apoteci

1. Kada se pružaju testiranja *point-of-care* (npr. merenje krvnog pritiska, holesterola, glikemije), davanje vakcina ili injekcija, ili pružaju druge usluge koje zahtevaju direktan kontakt sa pacijentom, potrebno je preduzeti dodatne zaštitne mere kao što su upotreba maske i rukavica.
2. Potrebno je da se ovakve usluge ograniče ili obustave ukoliko mogu da predstavljaju rizik po zdravlje zaposlenih u apoteci (npr. ukoliko pacijent ima simptome respiratorne infekcije).

Preporuke za zaposlene u apoteci

1. Da bi se obezbedio kontinuitet farmaceutskih aktivnosti, kad god je moguće podeliti tim zaposlenih po smenama (npr. jutarnja i popodnevna smena) sa kratkim zatvaranjem apoteke između kako bi se dezinfikovala cela apoteka i obezbedilo da članovi suprotnih smena nemaju međusobni kontakt.
2. Zaposleni sa oboljenjima koja kompromituju imuni sistem bi trebalo da koriste masku, a poželjno je da obavljaju druge zadatke u apoteci (ne za recepturom). Mere higijene ruku treba da budu pojačane.
3. Zaposleni bi trebalo češće da menjaju mantile.
4. Treba izbegavati nošenje nakita kao što su narukvice, satovi, prstenje.
5. Kad god je potrebno da se stavi maska, sprovesti higijenu i dezinfekciju ruku pre i posle stavljanja.

Preveli:
Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet i
Farmaceutska komora Srbije

