

COVID-19 PODSUMOWANIE WYTYCZNYCH #6

Izolacja pacjenta i skierowanie na konsultacje

1. Zapoznaj się z zasadami dotyczącymi odizolowania i skierowania na dalsze konsultacje podejrzanych przypadków COVID-19, opracowanymi przez krajowe, regionalne lub lokalne władze. Należy przestrzegać tych procedur i współpracować przy ich wdrażaniu.
2. W miarę możliwości należy odizolować podejrzany przypadek w oddzielnym pomieszczeniu w aptece i niezwłocznie wezwać odpowiednie służby ratunkowe lub skontaktować się z infolinią COVID-19.
3. Pomieszczenie do izolacji w aptece powinno w idealnym przypadku posiadać osobną łazienkę oraz minimum mebli i przedmiotów wymaganych dla wygody osoby oczekującej, w celu uniknięcia konieczności dekontaminacji niepotrzebnych przedmiotów.
4. Będąc w izolacji, pacjenci powinni zostać poproszeni o używanie maski medycznej.
5. Podczas izolacji podejrzanego pacjenta tylko jeden członek personelu apteki powinien mieć kontakt z pacjentem, nosząc odpowiednie środki ochrony osobistej (maskę, rękawice i okulary).
6. Po przekazaniu podejrzanego przypadku do placówki ochrony zdrowia lub domu w celu poddania go kwarantannie, pomieszczenie izolacji oraz wszelkie potencjalnie skażone miejsca, takie jak toalety, należy wyczyścić i zdezynfekować.

Szczegółowe informacje i dodatkowe odniesienia można znaleźć w pełnym dokumencie zawierającym wytyczne na stronie www.fip.org/coronavirus.

Niniejszy dokument opiera się na dowodach i zaleceniach dostępnych w momencie jego publikacji w renomowanych organizacjach. Będzie on aktualizowany w miarę pojawiania się nowej wiedzy. 26 marca 2020 r.

Przetłumaczono przez:

