COVID-19 PODSUMOWANIE WYTYCZNYCH #7

Czyszczenie i dezynfekcja

Żywotność SARS-CoV-2 w formie aerozolu i na różnych powierzchniach

Rodzaj powierzchni / aerozol	Żywotność	Okres półtrwania (godziny)
Aerozole	Do 3 godzin	1.1-1.2
Stal nierdzewna	Do 72 godzin	5.6
Tektura/papier	Do 24 godzin	3.46
Tworzywo sztuczne	Do 72 godzin	6.8
Miedź	Do 4 godzin	0.7

Źródło: Neeltje van Doremalen, 2020

Środki dezynfekujące lub metody dezynfekcji często zanieczyszczanych przedmiotów

SARS-CoV-2 jest wrażliwy na:

- Promieniowanie ultrafioletowe
- Ciepło (56°C przez 30 minut)
- Środki dezynfekujące (przez jedną minutę):
  - Eter
  - Etanol (62-75%)
  - Nadtlenek wodoru 0,5%
  - Podchloryn sodu 0,1%
  - Inne środki dezynfekujące zawierające chlor
  - Kwas nadoctowy
  - Chloroform
  - (Chlorheksydyna nie mogła skutecznie dezaktywować SARS-CoV-2)

Zalecane zastosowania

Ręce: Wodą z mydłem, środek do dezynfekcji rąk zawierający alkohol, środek do dezynfekcji zawierający chlor, nadtlenek wodoru

Skóra: 0,5% środek dezynfekujący na bazie jodu, nadtlenek wodoru

Błona śluzowa: 0,05% środek dezynfekujący na bazie jodu