

ENFERMEDAD POR EL VIRUS DEL ÉBOLA

CRIBADO Y DERIVACIÓN DE PACIENTES

GUÍAS PARA LOS FARMACÉUTICOS

Los síntomas de la enfermedad por el virus de Ébola (EVE) pueden ser similares a los de la gripe o un resfriado común. Si llega a la farmacia una persona susceptible de estar infectada, realice los siguientes pasos:

PASO 1: PREGUNTAR SI LA PERSONA:

- a. Tiene fiebre $> 38^{\circ}\text{C}$ o ha tenido fiebre en las últimas 24 horas.
- b. Ha atendido a alguien que sabe o sospecha firmemente tener la EVE o ha entrado en contacto con sus fluidos corporales o ha estado en un área afectada por el Ébola en los últimos 21 días. Dentro de los fluidos corporales se incluyen sangre, saliva, moco, vómito, orina, heces, semen, secreciones vaginales, sudor, lágrimas, leche materna, bilis y esputos.

Si la respuesta a AMBAS preguntas es SÍ, se debe sospechar de enfermedad por el virus del Ébola y seguir con el Paso 2.

Otros síntomas iniciales de la EVE pueden ser:

- Dolor de cabeza
- Dolor muscular y articular
- Dolor de garganta
- Debilidad intensa
- Calambres estomacales
- Diarrea
- Vómitos
- Sangrado (por ejemplo, de la nariz o la boca, o sangre en heces o vómitos)

PASO 2: DERIVAR EL CASO SOSPECHOSO

- a. Aislar al paciente en una habitación separada siempre que sea posible; y
- b. Ponerse en contacto con los servicios de emergencia apropiados (pedir que envíen un equipo de profesionales capacitados y protegidos para el transporte de la persona al centro de salud designado).

Si usted sabe o sospecha que alguien en su comunidad puede tener la EVE, anime y apoye a esa persona a recibir de inmediato el tratamiento médico adecuado en un centro de salud apropiado. Las personas con la EVE no deben ser tratadas en casa.